

核准日期：2007.03.27
修改日期：2009.12.24
修改日期：2011.05.31
修改日期：2017.07.03
修改日期：2017.08.11
修改日期：2020.09.20

去痛片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
严禁用于食品和饲料加工

【药品名称】

通用名称：去痛片
英文名称：Compound Aminopyrine Phenacetin Tablets
汉语拼音：Qutong Pian

【成份】

本品为复方制剂，每片含氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg。

【性状】本品为白色片。

【适应症】用于发热及轻、中度的疼痛。

【规格】本品为复方制剂。

【用法用量】需要时服用一次1~2片，一日1~3次。

【不良反应】

本复方所含氨基比林和非那西丁均有明显不良反应。服用氨基比林可有呕吐、皮疹、发热、大量出汗及发生口腔炎等，少数可致中性粒细胞缺乏、再生障碍性贫血、渗出性红斑、剥脱性皮炎、龟头糜烂等。长期服用非那西丁可引起肾乳头坏死、间质性肾炎并发生急性肾功能衰竭，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌，还可造成对药物的依赖性。非那西丁还易使血红蛋白形成高铁血红蛋白，使血液的携氧能力下降，导致紫绀，还可引起溶血、肝脏损害，并对视网膜有一定毒性。

【禁忌】对氨基比林、非那西丁、咖啡因或苯巴比妥类药物过敏者禁用。

【注意事项】

(1)本品长期服用，可导致肾脏损害，严重者可致肾乳头坏死或尿毒症，甚至可能诱发肾盂癌和膀胱癌。不宜长久使用，以免发生中性粒细胞缺乏，用药超过1周要定期检查血象。

(2)氨基比林在胃酸下与食物发生作用，可形成致癌性亚硝基化合物，特别是亚硝胺，因此有潜在的致癌性。

(3)长期服用可造成依赖性，并产生耐受。

(4)对各种创伤性剧痛和内脏平滑肌绞痛无效。

【孕妇及哺乳期妇女用药】不推荐使用。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】更易致肾功能损害，宜慎用。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】

为一复方解热镇痛药。其中氨基比林和非那西丁能抑制下视丘前列腺素的合成和释放，恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用；同时还通过抑制前列腺素等的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放，稳定溶酶体酶，影响吞噬细胞的吞噬作用而引起抗炎作用。咖啡因为中枢神经兴奋药，能兴奋大脑皮层，提高对外界的感应性，并有收缩脑血管，加强前两药缓解头痛的效果。苯巴比妥具有镇静、催眠、抗惊厥作用，可增强氨基比林和非那西丁的镇痛作用，并预防发热所致之惊厥。

【药代动力学】尚不明确。

【贮藏】密闭，置干燥处保存。

【包装】

塑料瓶包装：30片/瓶、100片/瓶、1000片/瓶；
塑料薄膜包装：2片/袋×200袋/盒，2片/袋×400袋/盒，50片/袋，2片/袋×1000袋/袋；
铝塑泡罩包装：40×12片/板/盒；40×15片/板/盒。

【有效期】塑料薄膜包装有效期：24个月，其它包装有效期：36个月。

【执行标准】卫生部药品标准 WS_{1-15(B)}-89。

【批准文号】国药准字 H37020304。

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司
生产地址：山东省淄博市张店区东一路14号
邮政编码：255005
电话号码：0533-2196361
传真号码：0533-2196365
网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称：山东新华制药股份有限公司
注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区
邮政编码：255000
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2184991
网 址：www.xhzy.com

E

品名规格	去痛片	改版项目	说明书	签字及日期	马建华 2020.09.23
包装材质		版本号	E		
成品尺寸	118mm×95mm	印刷颜色	黑色 (印刷与提供色样有偏差， 以最后印刷稿为准。)		
修订日期		字体			